



Artigo Original

ESTUDO DO ÍNDICE DE MALFORMAÇÕES ORO-FACIAIS EM NEONATOS NO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ – BAHIA

STUDY OF THE INDEX OF MALFORMATIONS ORO-FACIAIS IN NEONATOS IN THE HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES IN JEQUIÉ CITY – BAHIA

Resumo

Carlos Vieira Andrade Junior¹
Leandra E. Gomes de Oliveira¹
Alexinaldo Pinheiro Bandeira¹
Beatriz de Carvalho Silva¹
Leandro Dias de Jesus¹
Mayanna Freitas de S. Viana¹
Sídia Cássia R. S. Almeida¹
Thaise Souza Oliveira¹

Esta pesquisa teve como objetivo determinar a incidência das malformações orofaciais em recém-nascidos no município de Jequié-BA, no período de 2001 a 2006. Para tanto foi realizado um levantamento de informações nos registros da maternidade do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) onde se verificou incidência de malformação em 1/298,4 nascidos vivos. Quanto à prevalência de malformação em relação ao gênero, foi observada uma maior ocorrência no sexo feminino (60%). A fenda lábio palatal (FLP) representou a mais freqüente das malformações.

¹Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Jequié – BA – Brasil

Palavras-chave: fenda labial, fenda palatina, incidência, prevalência.

E-mail
cvjr.odonto@uol.com.br

Abstract

This research had as objective to determine the incidence of the just-born orofacial malformations in the city of Jequié-BA, in the period of 2001 the 2006. For in such a way a survey of information in the registers of the maternity of the Hospital Geral Prado Valadares(HGPV) was carried through where if verified incidence of malformation in 1/298.4 been born livings creature. How much to the prevalence of malformation in relation to the sex, a bigger occurrence in the feminine sex was observed (60%). The cleft palate lip (FLP) represented most frequent of the malformations.

Key words: ozone Cleft lip, cleft palate, Incidence, prevalence.